

什么是结核病?

结核病 (Tuberculosis, 简称“TB”) 是由**结核杆菌** (*Mycobacterium tuberculosis*) 引起的传染性疾病。结核病分为两种形式。



活跃型结核病

活跃型结核病患者
有可能出现**结核病**的症状也
可能把**结核病**传染给其他人



潜伏型结核病感染

有潜伏型结核病的人
不会有症状, 也不会把
结核病传染给其他人



结核病如何传播？

结核病的传播途径**一般**上是透过与活跃型结核病患者**密切和长时间**接触。例如，与患者长时间* 待在一个有冷气或通风不良的密闭空间。

*长时间：累计8个小时或以上



结核病**可**通过以下方式传播...



居住在同一户家庭



共住一个房间


结核病**不会**通过以下方式传播...



与其他人握手



分享食物或饮料




触碰床单或马桶座椅



结核病有哪些症状 需要留意?



夜间盗汗




持续发烧



持续咳嗽
至少三周



疲劳



体重减轻



胸口疼痛



痰中带血



如果出现**结核病**症状 应该怎么办？



- 1 如有不适，应尽快自我隔离并寻求治疗
- 2 前往全科诊所或综合诊疗所就医
- 3 告知医生您有结核病症状
- 4 如果怀疑是感染结核病，医生可能会做进一步的检查，并将您转介至结核病控制中心进行检测
- 5 如果确诊为结核病（潜伏型或活跃型），那么您将被安排接受相应的治疗



及时采取行动以保障您和他人的健康



National Centre for
Infectious Diseases