

结核病会导致死亡吗？



- 1 结核病可以用抗结核药物治愈。
- 2 如果没有获得适当的治疗，结核病患者有可能会死亡。
- 3 根据世界卫生组织的《全球结核病报告》，在2021年约有160万人死于结核病。



值得庆幸的是，在新加坡，结核病导致死亡的案例实为少数。本地居民因结核病的死亡率为每10万人0.7例，在2018年有28人死于结核病。



结核病能治愈吗？



1 结核病是可以通过**治疗而痊愈**的。

2 如果您被确认与**活跃型/潜伏型**结核病患者有**密切接触**，**请前往结核病控制中心** (Tuberculosis Control Unit 简称 TBCU) **接受检测**。

3 如果您被诊断患有**活跃型或潜伏型**结核病，则需要**接受治疗**以防止**传染或日后引发活跃型**结核病。

4 **及早诊断和接受有效的治疗**，**可预防严重的并发症和死亡**。



National Centre for
Infectious Diseases

如何治疗和管理 活跃型结核病？



- 1 活跃型结核病的治疗是通过直接观察疗法*让患者服用药物，而一般疗程为六至九个月。
- 2 接受治疗的患者必须前往结核病控制中心或综合诊疗所接受直接观察疗法和复诊。

#您知道吗？



- 遵照指示服药的**结核病患者有超过95%被治愈**。
- 如果没有遵守指示服药可能导致抗药性结核病。这将导致治疗时间变长，治疗难度也更高。
- 新加坡公民/永久居民在接受结核病治疗时可享有**大量津贴**。

*直接观察疗法 (Directly Observed Therapy, 简称DOT) 指的是在医生、护士或受过训练的医疗人员的监督下服药。



National Centre for
Infectious Diseases

如何治疗和管理 潜伏型结核病？



1

潜伏型结核病的管理包括采取预防性治疗*，以降低日后引发活跃型结核病的风险。

2

预防性治疗包括服用抗结核病药物，常见的包括：

- 连续4个月服用利福平 (Rifampicin)，或者
- 连续6个月服用异烟肼 (Isoniazid)



#您知道吗？

接受潜伏型结核病治疗时，药物是**免费**的。

*以预防潜伏型结核病在日后引发活跃型结核病。



National Centre for
Infectious Diseases